

	性別	診断名	検査	投薬・注射	算定日数
R5.4	女	尿路感染症	尿検査	ユナシン(375) 2 T 2× レボフロキサシン(500) 1 T 1×	7日 3日
	女	尿路感染症	尿検査	レボフロキサシン(500) 1 T 1×	7日
	女	尿路感染症	採血・尿検査	レボフロキサシン(500) 1 T 1×	5日
R5.5	女	蜂窩織炎	血液検査	セフトリアキソンナトリウム 1g D I V レボフロキサシン(500) 1 T × ユナシン(375) 2 T 2×	10日
	男	蜂窩織炎		ユナシン(375) 2 T 2×	5日
R5.6	女	尿路感染症	尿検査	ファロム(200) 3 T 3×	7日
	女	尿路感染症	尿検査	レボフロキサシン(500) 1 T	7日
	女	蜂窩織炎		セフトリアキソンナトリウム 1g	5日
	女	帯状疱疹		バルトレックス(500) 6 T 3	6日
	女	尿路感染症	検尿・採血	レボフロキサシン(500) 1 T	3日
	女	尿路感染症	検尿	ユナシン(375) 2 T 2×	2日
	女	蜂窩織炎	採血・採尿	ユナシン(375) 2 T 2×	6日
R5.7	女	尿路感染症	尿検査 採血	レボフロキサシン(500) 1 T 1×	6日
	女	尿路感染症	尿検査	レボフロキサシン(500) 1 T 1×	7日
	女	尿路感染症	尿検査	レボフロキサシン(500) 1 T 1×	5日
	女	尿路感染症	尿検査	ユナシン(375) 2 T 2×	5日
	女	尿路感染症	尿検査	レボフロキサシン(500) 1 T 1×	4日
R5.8	女	尿路感染症	尿検査 採血	レボフロキサシン(500)	1日
	女	尿路感染症	検尿	ファロム(200) 3 T 3×	7日
	女	尿路感染症	検尿	ユナシン(375) 2 T 2×	7日
R5.9	女	蜂窩織炎		ユナシン(375) 2 T 2×	5日
	男	尿路感染症	尿検査	レボフロキサシン(500) 1 T 1×	7日
	男	蜂窩織炎	血液検査	ミノマイシン(50) 4 T 2×	10日
	女	蜂窩織炎	血液検査	ユナシン(375) 2 T 2× ミノマイシン(50) 4 T 2×	7日 3日
R5.10	女	尿路感染症	尿検査	レボフロキサシン(500) 1 T 1×	5日
	女	肺炎	尿検査 酸素飽和度測定	ソルデム 3 A 5 0 0 m l D I V	2日
	女	蜂窩織炎		ユナシン(375) 2 T 2×	2日
R5.11	男	尿路感染症	尿検査	レボフロキサシン(500) 1 T 1×	7日
	女	尿路感染症	尿検査	レボフロキサシン(500) 1 T 1×	7日
	女	尿路感染症	尿検査	レボフロキサシン(500) 1 T 1×	6日
	女	尿路感染症	尿検査	レボフロキサシン(500) 1 T 1×	5日
	女	尿路感染症	尿検査	ユナシン(375) 2 T 2×	7日
	男	肺炎	採血	セフトリアキソンNa 1g 2×	7日

	性別	診断名	検査	投薬・注射	算定日数
R5.12	女	尿路感染症	検尿	コナシ(375) 3 T 3 ×	6日
	女	尿路感染症	検尿	レボフロキサシ(500) 1 T 1 ×	7日
R6.1	女	尿路感染症	検尿	ファロム(200) 3 T 3 ×	7日
	女	尿路感染症	検尿	レボフロキサシ(500) 1 T 1 ×	7日
	女	尿路感染症	検尿 採血	レボフロキサシ(500) 1 T 1 ×	7日
	女	尿路感染症	検尿	ユナシン(375) 2 T 2 ×	10日
	女	蜂窩織炎	V/Sチェック	ファロム(200) 3 T 3 × ユナシン(375) 2 T 2 ×	7日 1日
R6.2	女	蜂窩織炎		ユナシン(375) 2 T 2 ×	4日
	男	肺炎	酸素飽和度測定	レボフロキサシ(500) 1 T 1 ×	3日
	女	尿路感染症	検尿	ユナシン(375) 2 T 2 ×	5日
R6.3	女	尿路感染症	検尿	コナシ(375) 2 T 2 ×	5日
	女	尿路感染症	検尿	レボフロキサシ(500) 1 T 1 ×	7日
	女	尿路感染症	採血・検尿	コナシ(375) 2 T 2 ×	7日
	女	尿路感染症	検尿・採血	レボフロキサシ(500) 1 T 1 ×	7日
	女	尿路感染症	採血・検尿	コナシ(375) 2 T 2 ×	7日
	男	肺炎	酸素飽和度測定	レボフロキサシ(500) 1 T 1 ×	4日